

## 麻疹是什么?

东莞市疾病预防控制中心

设计 / 编印

被感染的  
病 人没抵抗力的  
其他 人

发热


皮疹

咳嗽

出疹前、后5天都有传染性。

发热 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ，出现流涕、喷嚏、咳嗽等。别以为是感冒！

典型麻疹的潜伏期7-21天，平均为8-12天。



## 麻疹病毒

麻疹病毒通过病人咳嗽出来的飞沫感染别人。

90%

接触病人后，没抵抗力的人90%以上会生病。



并发症	概率	并发症	概率
肺炎	10%	中耳炎	多见
喉炎	1%-4%	脑炎	1%

麻疹病人可能会出现的并发症

我省、市麻疹发病，一般春季开始上升，3-5月多发。  
治疗麻疹没有特效药，在发病之后主要是以对症治疗为主，同时防止并发症的发生。

麻疹病毒真可怕，怎么办？

预防接种小知识 (一)

yù fáng

# 如何预防麻疹

东莞市疾病预防控制中心

设计 / 编印

打疫苗

看医生  
搞卫生

防控传染病，接种疫苗最有效。目前在东莞市可通过接种麻腮风疫苗预防麻疹病毒。

## 小朋友的接种方法



8 月龄

8月龄、18月龄分别免费接种1次麻腮风疫苗。

18 月龄

未完成含麻疹等成分疫苗接种且未满18周岁的人群均应进行查漏补种。

## 成人的接种方法

成人如果不知道自己是否有抗体，可以自愿、自费接种1剂次麻腮风疫苗。需要注意的是，女性接种麻腮风疫苗3个月之后，才能怀孕。



## 麻腮风疫苗



接种疫苗获得抵抗力

按照国家要求，小朋友在接种麻腮风疫苗之后，95%以上的儿童能获得足够的抗体，这样就能抵抗和预防麻疹、风疹、流腮病毒了。

如果出现发热、红色皮疹、咳嗽等症状时，应及早就医。



麻疹病人应隔离治疗，原则上隔离至出疹后第5天。并发症感染者延长至14天。



病人所在的场所应开窗通风，病人使用过的物品应及时清洁。学校、工厂等集体单位发生麻疹疫情后要避免集体活动。



麻疹是什么？翻到这边看看

关于本页宣传小知识，如果您有任何疑问，可咨询东莞市疾病预防控制中心，免疫规划所，电话：22694738, 23663791, 22625613。



想了解更多疫苗知识，get到更多防病大招，可以扫描二维码，关注“东莞疾控”微信公众号。